GUDAIR

Vacuna inactivada contra la paratuberculosis en ganado ovino y caprino

• COMPOSICIÓN:

La vacuna consiste en una suspensión de microorganismos de la cepa 316F de *Mycobacterium paratuberculosis* inactivados por calor y adyuvados con aceite mineral en emulsión múltiple. Contiene 2.5 mg de microorganismos desecados por mililitro. Como agente conservante se emplea tiomersal.

• INDICACIONES Y ESPECIES DE DESTINO:

Inmunización activa frente a la paratuberculosis del ganado ovino y caprino exclusivamente.

• MODO DE EMPLEO Y DOSIS:

Administración subcutánea. Evitar la administración en las zonas de roce y apoyo.
Dosis: Ovino/caprino……1 ml

• EFECTOS SECUNDARIOS:

La vacuna produce en el punto de inoculación un nódulo inflamatorio que gradualmente evoluciona hacia un nódulo fibroso y frío persistente, indicativo de la "toma vacunal".
Es normal, como resultado de la vacunación que el nódulo aparezca a los 7-15 días. En aquellos casos en los que se inocule la vacuna a animales infectados (impacto antigénico secundario) cabe esperar una reacción local mas intensa.
Estas reacciones se corresponden con la respuesta inmune al adyuvante completo de Freund (antígeno de Mycobacteria con excipiente oleoso).

• ADVERTENCIAS:

La vacunación sensibiliza a los animales frente a la PPD (Derivado Proteico Purificado), Johnina, tuberculina PPD aviar y, en menor medida, la tuberculina PPD bovina. La reacción frente a la tuberculina PPD aviar es mas intensa que frente a la tuberculina PPD bovina y claramente diferenciable.
Como con cualquier especialidad inmunológica, pueden producirse reacciones de hipersensibilidad.

Advertencias para el Usuario
Este producto contiene un aceite mineral. Su inyección accidental (autoinyección) puede provocar dolor agudo e inflamación, especialmente si se inyecta en una articulación o en un dedo y, ocasionalmente, podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona con urgencia atención médica.
En caso de inyectarse accidentalmente este producto, busque urgentemente atención medica, incluso si se he inyectado una cantidad muy pequeña y lleve el prospecto consigo.
Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen medico, solicite de nuevo atención médica.

No dejar al alcance de los niños.

• TIEMPO DE ESPERA:

Cero días

• PRESENTACIÓN:

Envase de 30 ml. (30 dosis)

• CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:

Conservar entre +2 y +8°C (*) (no congelar)

• PRESCRIPCIÓN VETERINARIA:

Reg. N°: 11.091
Titular: CZ Veterinaria, S.A.
Aptdo. 16 - 36400 Porriño (Pontevedra)